



MedMPAnet^{project}

تميز الفئات الإحيائية الرئيسية الموجودة
على طول ساحل المنتزه الكوف الوطني
(ليبيا)



دراسة بتكليف وتمويل من:

مشروع MedMPAnet

مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (CAR/ASP)
شارع الزعيم ياسر عرفات - صندوق بريد 337 - 1080 تونس سدكس - الجمهورية التونسية

الهيئة العامة للبيئة

صندوق بريد 13793
طرابلس - ليبيا

بإشراف:

عاطف الإمام، مدير مساعد لمشروع MedMPAnet
ياسين رمزي الصغّير، خبير مساعد لمشروع MedMPAnet

المسؤول العلمي للدراسة:

جيرار برجان، أستاذ في جامعة كورسيكا (فرنسا)

الخبراء:

حسين البزيري، دكتوراه في جامعة محمد الخامس (المغرب)
حبيب الإنقر، دكتوراه في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار (تونس)
ياسين رمزي الصغّير، خبير مساعد لمشروع MedMPAnet
إبراهيم بن عامر، الخبير في جامعة عمر المختار البيضاء (ليبيا)

مرجعية الدراسة:

المشروع النموذجي في ليبيا: نحو إنشاء شبكة المتوسطية للمحميات البحرية والساحلية في ليبيا
عقد رقم 09، 10، 11، 2010/12 MedMPAnet

بمشاركة:

عصام بورص، المختار السيد سعيد، مصطفى إبراهيم المنتصر، خالد مختار سعد، محمد الرميح: الهيئة العامة للبيئة
إبراهيم بن عامر، عبد الباسط محمد بن إبراهيم، عبد الغني عبد الفلاح: جامعة عمر مختار البيضاء
أبو بكر محمد أبو زيدا، محمد المصراطي: البحرية الليبية

صور:

جيرار برجان، حسين البزيري، حبيب الإنقر، ياسين رمزي الصغّير، عصام بورص، إبراهيم بن عامر

تمت هذه الدراسة في إطار المشروع الإقليمي لتنمية الشبكة المتوسطية للمحميات البحرية والساحلية من خلال دعم الجهود من أجل إنشاءها وإدارتها (MedMPAnet)

بدعم مالي من:



يذكر هذا التقرير على النحو التالي:

Pergent G., Bazairi H., Langar H., BEN AMER I., Sghaier Y.R., 2010. Caractérisation des principales biocénoses présentes le long du littoral du Parc National d'El Kouf. UNEP-MAP RAC/SPA Ed. RAC/SPA-MedMPAnet Project, Tunis : 79 pages.

(1) المضمون و الأهداف

إن المشروع الإقليمي لتنمية الشبكة المتوسطية للمحميات البحرية والساحلية من خلال دعم الجهود من أجل إنشاءها وإدارتها (MedMPANet) هو جزء من مشروع الشراكة الإستراتيجية من أجل منظومة إيكولوجية بحرية بالبحر المتوسط (FEM MedPartnership) الذي يديره برنامج الأمم المتحدة للبيئة- خطة عمل للمتوسط (PNUE/PAM). إن الهدف من هذا المشروع هو العمل على تطوير الإصلاحات المؤسسية والقانونية والحصول على تمويلات ضرورية للاستجابة لأولويات صون التنوع البيولوجي البحري والشاطئي للمتوسط.

يندمج المشروع الإقليمي لتنمية الشبكة المتوسطية للمحميات البحرية والساحلية من خلال دعم الجهود من أجل إنشاءها وإدارتها MedMPANet في الجزء 3 "صون التنوع البيولوجي : تفعيل برنامج العمل الاستراتيجي للمحافظة على التنوع البيولوجي بالإقليم المتوسطي (PAS BIO) و خطط عمل وطنية نسبية" و يديره مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (CAR/ASP) و يهدف إلى صون التنوع الشاطئي والبحري بتنمية شبكة مساحات بحرية متوسطة محمية. إن هذا المشروع يدخل ضمن توصيات بروتوكول اتفاقية برشلونة الخاصة بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة و التنوع البيولوجي البحري في المتوسط.

يهم هذا المشروع 12 دولة محاذية للمتوسط (ألبانيا، الجزائر، البوسنة و الهرسك، كرواتيا، مصر، ليبيا، المغرب، المونتينيغرو، سوريا، تونس و تركيا) من خلال أربعة خطط عمل كبرى : (1) وضع مشاريع نموذجية لخلق محميات بحرية (AMP) و تحليل آليات استدامة التمويل (2) إنشاء أنشطة ذات أولوية لخلق محميات بحرية (AMP) و التعرف على الأطراف المهتمة و الشراكات المطلوبة و تمييز المواقع البحرية القابلة لأن تكون محميات بحرية (AMP) (3) تبادل الخبرات و تعزيز القدرات الوطنية (4) التواصل و تحسين الجمهور.

تدخل ليبيا في أغلب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الهامة المرتبطة بصون الموارد البحرية. صادقت ليبيا في جويلية 2001 على اتفاقية التنوع البيولوجي (CDB) و أعلنت في الاجتماع 13 للأطراف المتعاقدة على اتفاقية برشلونة أن المناطق الغربية و الشرقية لليبيا تتمتع بأولوية في المرحلة الثانية من تفعيل برنامج العمل الاستراتيجي للمحافظة على التنوع البيولوجي بالإقليم المتوسطي (PAS BIO) (كتانيا، نوفمبر 2003).

في نطاق برنامج العمل الاستراتيجي للمحافظة على التنوع البيولوجي بالإقليم المتوسطي (PAS BIO) التزمت ليبيا بإعداد و تفعيل مخططات عمل وطنية تبعال:

- (1) خطة عمل وطنية حول المناطق البحرية و الشاطئية المحمية و المنتزهات الوطنية المبرمجة.
 - (2) خطة عمل وطنية من أجل المحافظة على السلاحف البحرية و مواطنها.
- من ناحية أخرى وقعت في بداية 2006 الهيئة العامة للبيئة (EGA) و برنامج الأمم المتحدة للبيئة - خطة عمل البحر للمتوسط - مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (PNUE-PAM-CAR/ASP) و الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة - مكتب البحر المتوسط (IUCN MED) و الصندوق العالمي للطبيعة - مكتب برنامج البحر المتوسط (WWF MedPO) مذكرة اتفاقية تعاون تهدف إلى إعانة ليبيا لاتخاذ عدة إجراءات خاصة بحماية التنوع البيولوجي. وقع التعرف على العديد من الأنشطة :

- (1) إطلاق عملية إنشاء منطقتين محميتين بحرية و شاطئية.
- (2) تعزيز الإطار القانوني لحماية المحيط في ليبيا.
- (3) إجراء جرد للمواقع البحرية التي تبدو مهمة للمحافظة عليها و إعداد برنامج لتكوين شبكة وطنية للمناطق البحرية و الشاطئية المحمية.

(4) تطوير خطة وطنية لإدارة النفايات.

(5) تشجيع السياحة المستدامة.

تدخل مبادرة المشروع الإقليمي لتنمية الشبكة المتوسطية للمحميات البحرية والساحلية من خلال دعم الجهود من أجل إنشاءها وإدارتها

(MedMPAnet) في ليبيا ضمن هذه الخطة و قد وقع إعدادها إثر العديد من اجتماعات التشاور مع ممثلي السلطات الليبية المؤهلة (الهيئة العامة للبيئة، EGA). إن الهدف هو توفير حجة قوية للهيئة العامة للبيئة (EGA) (على المستوى الاقتصادي و البيئي) من أجل خلق شبكة للمواطن الشاطئية و البحرية المحمية على طول الشواطئ الليبية بحيث سيقع تفعيل تقييم للتنوع البيولوجي البحري و الشاطئي في بعض المواقع (عين الغزالة، جزيرة إلبا و المنتزه الوطني بالكوف). سيهتم هذا التقييم بصفة خاصة ب :

(1) تمييز الطحالب الكبيرة و اللاقاريات الكبيرة و التجمعات السمكية و معاشب البوسيدونيا و السلاحف البحرية و الفقمة الراهبة و الطيور البحرية.

(2) إعداد برنامج متابعة.

(3) تكوين في الموقع حول تقييم التنوع البيولوجي البحري و الشاطئي و المتابعة البيئية و الاجتماعية-الاقتصادية.

أنشأ منتزه الكوف الوطني (3500 هكتار) سنة 1979 و يقع على طول الشاطئ الشرقي لليبيا بمحاذاة الجبل الأخضر. يبلغ ارتفاعه ما بين 0 و 850 م و يشمل حوض واد الكوف و روافده (واد السودان و واد بيت صالح). يتمثل في منطقة جبلية خاصة بشبه جزيرة سريناكا التي تمتد حتى الشاطئ حيث تشاهد هضاب رملية و بحيرات شاطئية مؤقتة (Hemsley, 1981). حسب القطاعات يتميز الغطاء النباتي بأدغال متوسطة كثيفة و أنبنة هضابية شاطئية أو خاصة بالأودية. توجد تقريبا 90 % من الأنواع التي وقع إحصاؤها من الانبنة الليبية في هذه المنطقة. تفضل هذه النباتات قبرص أو الحوض الشرقي على المنطقة الشرقية المجاورة (Boulos, 1975). إن الانبنة ذات خصوصية متوسطة مع عديد الأنواع من الثدييات (Hufnagl, 1972) و مجموعات طيرية شديدة التنوع (Baker, 1980 ; 1984).

تدخل الأبحاث الخاصة بمنتزه الكوف الوطني في إطار التعاون الثلاثي بين الهيئة العامة للبيئة (EGA) و مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (CAR/ASP) و مركز المحافظة على الشريط الساحلي بفرنسا (CDL) بهدف اقتراح توجهات للتصرف في منتزه الكوف الوطني بجزئيه البحري و البري. و تبعا لذلك جمعت المهمة المجرأة في أكتوبر 2010 خبراء ليبين و خبراء من مركز المحافظة على الشريط الساحلي بفرنسا (CDL) و تنقسم إلى جزئين : جزء بري (أنبنة و نباتات شاطئية و مجموعات حيوانات شاطئية : ثدييات، طيور، خفافيش، زواحف، برمانيات و حشرات بعسوية) و جزء بحري.

تنقسم الأهداف التابعة إلى الجزء البحري إلى أربعة أقسام :

- تمييز الفئات الإحيائية الرئيسية الموجودة على طول شاطئ منتزه الكوف الوطني و المناطق المحيطة به (التعرف، التوزيع، الوصف، الحيوية...).

- التعرف على أهم الأنواع النباتية و الحيوانية مع اهتمام خاص بالأنواع الموجودة في الملحق II من البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة و بالتنوع البيولوجي في المتوسط (البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة و بالتنوع البيولوجي في المتوسط ASP/DB, الملحق A) و الأنواع السمكية الليسبسية.

- التعرف على التصرفات و الضغوطات التي من شأنها أن تتسبب في اضطرابات بيئية و إجراءات التصرف المستعملة.

تعزيز القدرات الوطنية على الميدان حول التنوع البيولوجي البحري و طرق التصرف و تبادل الخبرات مع الخبراء الليبيين.

(2) تفصيل المهمة

المهمة الميدانية التي جرت من 23 إلى 30 أكتوبر 2010.

السبت 23 أكتوبر 2010

التحول من تونس إلى بنغازي.

الاستقبال في مطار بنغازي.

التحول من بنغازي إلى الكوف.

تحضير الوسائل اللوجستية و برنامج التدخل بالنسبة "للمجموعة البحرية".

اجتماع للتنسيق مع الخبراء الليبيين و خبراء من هيئة المحافظة على الشاطئ و خبراء من CAR/ASP: تقديم المهمة و قدرات مختلف المشاركين.

الأحد 24 أكتوبر 2010

الخروج سيرا على الأقدام على طول الساحل على مستوى الحد الشرقي لمنتزه الكوف الوطني. هي منطقة صخرية محاطة بمسطحات صخرية صغيرة مغطاة بالنباتات الكبيرة (*Cystoseira, Asparagopsis, Jania, Laurencia*) و بأنواع مميزة للشاطئ الوسطي (*Patella, Osilinus*).

الخروج في مركب على طول الواجهة الشاطئية لمنتزه الكوف الوطني ما يقرب 12 كلم. بالنظر إلى الطمي الرسوبي المرتبط بمصب واد الكوف فإن المظهر متشابه تقريبا على مجمل المنطقة. إن الساحل الصخري عموما تقطعه مجموعة خلجان رملية صغيرة. على المستوى البحري، تغطي القيعان الرخوة (الرمال الدقيقة) أغلب القطاع باستثناء المسطحات الصخرية المشاهدة في مستوى الرؤوس و حول بعض الجزر الصغيرة الموجودة على حافة الشاطئ. من ناحية أخرى و على عمق قليل (1- حتى 7- م) تشاهد العديد من البروزات الصخرية و هي عادة مغطاة بغابات من السيستوسيرا (*Cystoseira*).

الخروج في مركب على طول الشاطئ الواقع غرب حد المنتزه على مسافة تقدر ب 6 كلم. مظهر القاع متشابه تقريبا، غابات سيستوسيرا على المواد الصخرية على حافة الشاطئ و لكن شوهدت بقعة أولى لمعشب البوسيدونيا اوسيانكا (*Posidonia oceanica*) (أقل من هكتار) فوق صخرة. أجريت عمليتا غطس الأولى على حدود منطقة استكشافنا حول جزيرة صخرية صغيرة و الثانية في مستوى معشبة البوسيدونيا اوسيانكا. تسمح هذه الغطسات بانجاز مشاهدات أكثر دقة لما وقع جمعه من نباتات السيستوسيرا (من أجل تحديد الأنواع الموجودة) و التعرف على أنواع كثيرة من الأسماك. وقع اقتطاع حزم من البوسيدونيا اوسيانكا لإجراء تحليل مظهري وتحليل زمني لدورة الأوراق (*lépidochronologique*) لأن بنيتها هناك تبدو مميزة بأوراقها شديدة الضيق و سيقانها الترابية ذات الحجم الصغير الملتصقة بالصخور. شوهدت أيضا بعض طبقات السيقان الترابية (*mattes*) الميتة.

اجتماع تألفي مع خبراء ليبيين و خبراء من مركز المحافظة على الشريط الساحلي بفرنسا (CDL).

الاثنين 25 أكتوبر 2010

الخروج للموقع بالسيارة بسبب طقس غير مناسب (رياح جنوبية عنيفة جدا مما جعل استعمال المراكب صعبا). تمت مشاهدة موقعين غطسا شرق منتزه الكوف. كانت المواطن شديدة الشبه بما تمت مشاهدته بالأمس, مسطحات مغطاة بغابات سيستوسيرا على حافة المناطق الصخرية (من بعض الأمتار إلى بعض عشرات الأمتار عرضا) ثم قيعان رخوة (رمل دقيق). وقع التعرف على عديد الأنواع و تصويرها. شوهدت العديد من الانتهاكات خاصة اقتطاعات للرمال على مستوى الشواطئ و إلقاء للهيروكاربونات على شكل صفائح من القطران.

استطلاع عن طريق الغطس من أجل مواصلة التعرف على المواطن و الأنواع في مستوى الحد الشرقي لمنتزه الكوف الوطني. تقديم أهداف المهمة و جمع العمل المنجز ثم تكوين الخبراء الليبيين حول التنوع البيولوجي المتوسطي و النباتات البحرية (الطحالب).

الثلاثاء 26 أكتوبر 2010

الخروج في مركب شرق حد المنتزه على مسافة تقارب 9 كلم لتمييز الفئات الإحيائية الرئيسية و أنواع القيعان و البحث عن معشب بوسيدونيا اوسيانكا قد وقع التعرف عليه على صور أقمار صناعية (Google Earth). إن غابات السيستوسيرا موجودة دائما على المواد الصخرية و شوهدت أيضا تجمعات لنباتات ميتة على القيعان الرخوة الخالية من النباتات. وقع التعرف على معشب البوسيدونيا اوسنيكا بين 13- و 17- م وهو حد أكثر من حد القيعان الرخوة. ينمو المعشب فوق المواد الصخرية المرتفعة بالنسبة للرمال و يمتد نحو المياه العميقة. بدت حيوية المعشب أثناء الغطس جيدة جدا و المجموعات السمكية متنوعة. وقع اقتطاع حزم من البوسيدونيا اوسيانكا للقيام بتحليل مظهري وتحليل زمني لدورة الأوراق و شوهدت من ناحية أخرى تجمعات مرجانية محصورة على طول الصخور المتساقطة و الكهوف الصغيرة. إن انجاز تصوير فيديو في العمق مكن من التعرف على حد أقصى نحو 37 م عمقا بواسطة منظار calfat فيما يمتد الحد الأدنى أكثر من 40 م عمقا على ما يبدو.

استطلاع عن طريق الغطس في القطاع الواقع غرب حد المنتزه قصد إثراء قائمة الأنواع المشاهدة سابقا. تأليف المعطيات المتحصل عليها أثناء الغطس, تحضير النماذج و فرز حزم البوسيدونيا التي وقع جمعها شرق المنتزه (تحليل مظهري و تحليل زمني لدورة الأوراق). اجتماع تألفي مع الخبراء الليبيين و خبراء من مركز المحافظة على الشريط الساحلي بفرنسا (CDL).

الأربعاء 27 أكتوبر 2010

عدم خروج بسبب ظروف الطقس غير المناسبة و القيام بحصص تكوين مبرمجة للخبراء الليبيين. تركيز مصائد لصيد القشريات و شبكة ثابتة للأسماك قرب الحد الشرقي للمنتزه. مقابلة صيادين و مشاهدة أنواع أخرى مميزة للتجمعات السمكية في القطاع.

تأليف الصور المنجزة أثناء الغطس و التعرف على الأنواع و تحضير قائمة أولية تهتم الأسماك و الطحالب. تكوين للخبراء الليبيين حول الفئات الإحيائية الرئيسية التي وقعت مشاهدتها : الطحالب المحبة للضوء على الصخور, معشب بوسيدونيا اوسيانكا و المرجانيات.

اجتماع تألفي مع الخبراء الليبيين و خبراء من مركز المحافظة على الشريط الساحلي بفرنسا (CDL).

الخميس 28 أكتوبر 2010

عدم خروج بسبب ظروف الطقس غير المناسبة (عاصفة). القيام بحصص تكوين مبرمجة للخبراء الليبيين. تكوين نظري و تطبيقي للخبراء الليبيين حول تمييز معاشب البوسيدونيا اوسنيكا و خاصة حول التحاليل المظهرية والتحليل الزمنية لدورة الأوراق و تطبيق هذه التقنيات على الحزم التي وقع جنيها أثناء الغطس في القطاع الشرقي من المنتزه.

تكوين نظري و تطبيقي حول التعرف على الطحالب سيستوسيرا التي وقع جنيها أثناء الغطس و التعرف على ثلاثة أنواع. زيارة الموقع الأثري الشحات برفقة كل المشاركين في المهمة. تحضير عرض مصور يقدم أهم الملاحظات المجراة خلال المهمة. ملتقى لعرض النتائج المهمة بحضور السيد عبد ربه ادريس المسؤول على حراس شاطئ منطقة الكوف و السيد صالح المليكي المدير المحلي للهيئة العامة للبيئة (EGA) و قد وقع طرح طرق عديدة لشرح خصوصية التجمعات المشاهدة (ندرة شوكيات الجلد و غياب زهر البحر).

الجمعة 29 أكتوبر 2010


تحضير النماذج لتحديدتها في المستقبل (طحالب). تنظيم التجهيزات العلمية و أدوات الغطس. التحول من الكوف إلى بنغازي.

السبت 30 أكتوبر 2010

التحول من بنغازي إلى تونس. تأليف حول المجرى التطبيقي للمهمة و النتائج الأولية المتحصل عليها و أهم التوجهات التي وقع التعرف عليها لبقية البرنامج مع السيد عاطف الإمام مساعد رئيس المشروع الإقليمي لتنمية الشبكة المتوسطية للمحميات البحرية والساحلية من خلال دعم الجهود من أجل إنشاءها وإدارتها (MedMPA).

(3) المواقع المدروسة

- شملت الأبحاث ثلاثة قطاعات شاطئية (شكل 1)
- الشاطئ المحاذي لمنتزه الكوف الوطني.
 - الشاطئ الواقع غرب المنتزه و على مسافة ستة كيلومترات.
 - الشاطئ الواقع شرق المنتزه و على مسافة تسعة كيلومترات.



شكل 1 : القطاعات التي وقع جردها على طول شاطئ الكوف

وقع في المجموع استكشاف ما يقرب من 80 محطة بواسطة المركب باستعمال منظار Calfat (شكل 2) انطلاقا من الشاطئ و جرد ستة مواقع غطسا باستعمال صدرة الغوص أو بقطع النفس (شكل 3).



شكل 2 : تحديد المحطات المدروسة انطلاقا من المراكب



شكل 3 : تحديد المحطات المدروسة انطلاقاً من الشاطئ (ملاحظات) غطسا أو بقطع النفس

شملت هذه الاستكشافات قيعانا يتراوح عمقها بين 0 و 46 م على شكل تعرف موضعي بتصوير فيديو و وقع تحديد كل موقع بكل دقة بواسطة الأقمار الصناعية GPS (Garmin 276C) كما سجلت الفئات الإحيائية الرئيسية و أنواع القيعان الموجودة (الملحق B).

وقع تصوير الفئات الإحيائية الرئيسية و الأنواع المشاهدة من أجل الحد من اللجوء إلى الاقتطاعات و رغم ذلك فقد وقع اقتطاع بعض الطحالب خاصة من أنواع و جنس سيستوسيريا لتعرف مستقبلي و كذلك وقع جني عشر حزم من البوسيدونيا اوسيانكا لإجراء تحليل مظهري وتحليل زمني لدورة الأوراق (تمييز المعشبة و تكوين الخبراء الليبيين لتقنيات الاستكشاف هذه).


(4) أهم الملاحظات المجراة

1.4 الفئات الإحيائية الرئيسية و أنواع القيعان

شمل العمل الميداني ثلاثة طوابق : الطابق فوق الساحلي و الطابق الساحلي الوسطي و الطابق تحت الساحلي (شكل 4) و قد وقع التعرف على الفئات الإحيائية الرئيسية الموجودة و تمييزها بالنسبة لكل طابق :


الطابق فوق الساحلي

هي المنطقة الأعلى للشاطئ، لا يبتل هذا الطابق إلا بالرذاذ أو المد الاعتدالي أو أكبر أمواج العواصف. اهتمنا أثناء هذا البحث بصفة خاصة "بالفئات الإحيائية للصخور فوق الشاطئية" و توجد هذه الفئات الإحيائية في القطاعات الثلاثة المدروسة و هي ممثلة جيدا بصفة خاصة على مستوى الرؤوس الصخرية حتى و إن كانت موجودة أيضا على مستوى الجزر الصغيرة على حافة الشاطئ (شكل 5).



شكل 4 : مقطع مبسط لمختلف المناطق القاعية التي وقع اعتبارها.

امتداد هذه الفئات الإحيائية محدود نسبيا و إذا كانت بعض الأنواع المميزة موجودة (*Euraphia depressa* مرادف *Chtamalus depressus*, شكل 6) إلا أن أنواعا أخرى غائبة (نوع *Melarhaphé*) و كذلك فإن البرك فوق الشاطئية تتميز بتجمعات فقيرة جدا خاصة على مستوى النباتات الكبيرة (شكل 7). تظهر الفئات الإحيائية الرملية فوق الشاطئية انخفاضات خلف الشاطئ بسبب انتزاع الرمل لغرض البناء (شكل 8).



شكل 6 : تجمع *Euraphia depressa*



شكل 5 : شاطئ منتزه الكوف الوطني



شكل 8 : منخفض خلف الخط الشاطئي



شكل 7 : برك فوق شاطئية

الطابق الشاطئي الوسطي

هي منطقة تموج المد، تتعرض الكائنات الحية في هذه المنطقة إلى تناوب الغطس و الانجلاء و باعتبار ضعف المد في البحر الأبيض المتوسط فان هذا الطابق يظهر بصفة عامة امتدادا عموديا محدودا. إن "الفئات الإحيائية الحثائية للطابق الشاطئي الوسطي" و خاصة "سحنة أكداش أوراق البوسيدونيا اوسيانكا الميتة و ذوات الأزهار الأخرى" ممثلة جيدا في الخلجان الرملية الصغيرة (شكل 9) و هذه الأكداش مكونة أساسا من أوراق البوسيدونيا اوسيانكا من الطحالب من جنس سيستوسيرا.


إن "الفئات الإحيائية الصخرية العليا للمنطقة الشاطئية الوسطية" و كذلك "الفئات الإحيائية الصخرية السفلى للمنطقة الشاطئية الوسطية" لا تظهر تجمعات خاصة وهي تتقابل على مستوى الرؤوس الصخرية و الجزيرات الصغيرة (شكل 10). وقع التعرف على العديد من الأنواع المميزة لهذا الطابق و خاصة معديات القدم (*Patella rustica*, *Patella coerulea*,) و القشريات (*Eriphia verrucosa*, *Ligia italica*) (شكل 11 و 12).



شكل 10 : تجمعات الطابق الشاطئي الوسطي



شكل 9 : أكداش بوسيدونيا اوسيانكا




شكل 11 : معديات الأقدام *Osilinus turbinata*



شكل 12: قشريات *Ligia italica*


الطابق الشاطئ السفلي

يوجد أسفل الطابق السابق. يمتد إلى الحد الأدنى (العمق الأقصى) للنباتات الكبيرة و بصفة خاصة معشبة البوسيدونيا اوسيانكا في البحر الأبيض المتوسط (30- م, 40-م). تتعرض الكائنات الحية الموجودة و الغاطسة باستمرار الى ضوء شديد كما هو الحال للطوابق السابقة فان مجموعتين من الفئات الإحيائية كانتا موضوع أبحاث خاصة و هما معشبة البوسيدونيا اوسيانكا و " الفئات الإحيائية للطحالب المحبة للضوء". يجب ملاحظة كون اغلب القيعان التي وقعت دراستها تحتوي موادا رخوة خالية من النباتات و تتمثل في "الفئات الرملية الإحيائية الدقيقة ذات المستوى العالي" على مستوى الشواطئ و "الفئات الإحيائية الرملية المعيرة" في الأماكن الأكثر عمقا (شكل 13). تشاهد القيعان الرخوة في بعض القطاعات الشاطئية حتى 46 مترا عمقا.



شكل 13 : التوزيع العام للقيعان الرخوة لشاطئ منتزه الكوف الوطني

توجد "الفئات الإحيائية للطحالب المحبة للضوء" أساسا على حافة الشاطئ و على البروزات الصخرية الموجودة نحو الداخل بالنسبة للقطاعات الثلاثة التي وقعت دراستها. تشاهد هذه الفئات الإحيائية بين السطح و عمق 6م وهي تتكون أساسا من غابات واسعة من السيستوسيرا (شكل 14 و 15, ملحق C)



تنمو معشبة البوسيدونيا اوسيانكا أساسا على المواد الصخرية و قد وقع التعرف على محطتين الأولى في القطاع الغربي و هي عبارة عن بروز صخري ما بين 2 و 4 م عمقا و بمساحة أقل من هكتار (شكل 16 و 17).




شكل 17 : معشبة بوسيدونيا اوسيانكا على الصخور (مشهد عمودي)



شكل 16 : معشبة بوسيدونيا اوسيانكا على الصخور (مشهد أفقي)


أما الثانية وهي موجودة أكثر نحو الداخل (15م-20م) في القطاع الشرقي، فتغطي مساحة أهم و تبدو كحد أعلى على الصخر لمعشبة تمتد أكثر عمقا (شكل 18). إن بنية القاع شديدة التنوع داخل معشبة البوسيدونيا اوسيانكا هذه و ينتج عن ذلك مشاهد تحت مائية ذات أهمية كبرى و بنيات خاصة (تراكيب عمودية، كهوف صغيرة و أقواس) تؤوي مجموعات مرجانية ذات تنوع بيولوجي هام (شكل 19 و 20).



شكل 20 : مجموعة مرجانية عمودية




شكل 19 : قوس تحت مائي 1.5- م




شكل 18 : خريطة مبدئية لأهم المجموعات و أنواع القيعان في القطاع الشرقي لشاطئ منتزه الكوف الوطني

2.4. النباتات الكبيرة

تم التعرف على نوع واحد من ذوات الأزهار في الموقع و بقايا على الشواطئ و هو البوسيدونيا اوسيانكا. يبدو أنه في قطاع الكوف لا ينمو إلا على المواد الصخرية حيث تكون فوقها طبقة سيقان ترابية يبلغ ارتفاعها بعض عشرات السنتيمترات أو صفيحة بسيطة على الصخر (شكل 21 و 22).



تظهر المعاشب المشاهدة حيوية جيدة (تغطية مهمة, نمو لسيقان جارية منحنية) رغم مشاهدة محلية لطبقات سيقان ترابية ميتة (شكل 23 و 24) يمكن أن ترتبط أصولها بديناميكية طبيعية للمعشبة في القطاعات حيث التيارات المائية قوية جدا رغم انه لا يمكن استبعاد اثر الصيد بالديناميت في بعض القطاعات. بالنظر إلى شفافية المياه فان الحد الأدنى (امتداد قاعي أقصى) للبوسيدونيا اوسيانكا يبدو عميقا جدا وفي هذا السياق فقد تم التعرف على معاشب على عمق 37- م و تبدو ممتدة نحو الداخل.



يؤكد التحليل المظهري لحزم البوسيدونيا اوسيانكا المشاهدات المجرة في الموقع و تتمثل في أوراق قليلة العرض (ملحق D). في الموقعين (القطاع الغربي و القطاع الشرقي) و في العمقين (3- م و 15- م) الذين وقع اعتبارهم يبلغ العرض المتوسط للأوراق على التوالي 7.1 ± 0.2 و 6.9 ± 0.3 مم و ينتج عن ذلك مساحة ورقية تبلغ 127.6 ± 15.8 صم² في الحزمة على عمق 15 م و هذا أيضا أقل من التقديرات العادية التي وقع قياسها في البحر المتوسط (PNUE-PAM-) (Pergent-Martini & Pergent, 2010, 2009, CAR/ASP).

يؤكد التحليل الزمني لدورة الأوراق نموا عاديا محدودا جدا (بين 3.2 ± 0.9 مم على عمق 3- م و 3.8 ± 0.9 مم على عمق 15- م) و هو أمر عادي على المواد الصخرية خاصة إذا كانت هذه الأخيرة معرضة لتيارات مائية قوية. يعتبر عدد الأوراق الناتجة ضعيفا أيضا و يقدر ب 6.4 ± 0.7 في المحطة 15- م. بالنسبة لهذين المعطيين فان التقديرات التي يقع قياسها عموما في البحر الأبيض المتوسط تتراوح بين 5 و 8 مم بالنسبة للنمو السنوي للسيقان الجارية و بين 7.0 و 7.5 ورقة بالنسبة لإنتاج الأوراق (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2009, Pergent-Martini & Pergent, 2010). يبدو أن قلة عرض الأوراق و سرعة نمو السيقان الجارية مرتبطة بنقص الغذاء في المياه (الحوض الشرقي). أجريت ملاحظات مشابهة في قطاعات أخرى من البحر الأبيض المتوسط (سردينيا, Pergent-Martini et al., 1994).

الطحالب

زيادة على نوعين من رتبة Nostocales (Cyanophyceae) التي تنتمي شعبة الطحالب الزرقاء Cyanobacteria فإنه وقع التعرف على 19 نوعا من الطحالب الكبيرة. و تتوزع هذه الأخيرة على خمسة طوائف و عشر رتب في الشعب الثلاثة Chlorophycophyta و Rhodophycophyta, Heterokontophyta (الجدول I ملحق F). إن رتبتي (Rhodophycophyta) corallinales و Fucales (Heterokontophyta) هما الأكثر تمثيلا بخمسة أنواع لكل منهما. أربعة من خمسة أنواع من Heterokontophyt (لم يقع تحديد الخامسة بصفة خاصة) موجودة على القائمة في الملحق II من بروتوكول ASP/DB (الملحق A).

إن التعرف على السيستوسيرا يعتمد على ملاحظة خصائص مورفولوجية غير مشاهدة عادة على الكائن الحي انطلاقا من موسم الصيف حتى الربيع (في ظروف شمال غرب المتوسط) و ينتج عن ذلك و باعتبار توقيت انجاز هذه المهمة أن التعرف على مقاطع السيستوسيرا يحتاج إلى تأكيد.

إن جميع الأنواع المتعرف عليها حسب انتمائها الحيوي-الجغرافي يسمح باستنتاج أن مجموعة الأنواع ذات التقارب الاستوائي مع العناصر الموجودة في مختلف المناطق الاستوائية (P) و أنواع المحيط الهندي-الهادي (IP) و الأطلسية-الاستوائية (At) و العناصر الاستوائية للمحيطين الأطلسي و الهادي (Apt) و مجموع الأنواع العالمية (C) و تحت العالمية (SC) هي الأكثر تمثيلا (6 لكل مجموعة) متنوعة بأنواع العنصر المتوسطي (M, 4 أنواع) و المتكونة أساسا من السيستوسيرا. يمكن شرح هذه التركيبة الزهرية بانتفاء منطقة الدراسة إلى الحوض الشرقي للمتوسط.

من بين جميع الأنواع التي وقع جردها يوجد نوع واحد أصيل منطقة المحيطين الهندي-الهادي *Asparagopsis taxiformis* يمكن وصفه بالدخيل على المتوسط و لكنه متأقلم (Verlaque et al., 2007).

يمكن أن يكون النوع المشاهد من جنس *Padina* نوعا ثانيا دخيلا على المتوسط و يمثل هذا الجنس في المنطقة النوعان *boergesenii* أو/ و *pavonica* و كلاهما مسجل في الجزء الخاص بالنباتات البحرية الليبية و يعتبر النوع

boergesenii من قبل (Verlaque et al., 2007) دخيلا متأقلا في المتوسط كما هو حال *Asparagopsis taxiformis*. في نفس السياق يمكن خلط هذا النوع من *Padina* مع أي نوع من هذا الجنس الدخيل في المتوسط مثل النوع المحيطي الهندي-الهادي *Padina boryana*. إن التعرف على النوع الموجود لم يقع انجازه لسوء الحظ نظرا لغياب نماذج المقتطعات.

لا يمثل عدد الأنواع المتعرف عليها في منطقة هذه المهمة إلا نسبة ضئيلة جدا (10.7 %) من النباتات الليبية المذكورة من قبل (Nizamuddin et al, 1979) و لكنها تمثل 46 % من الأعداد التي وقع جردها في طبرق بالنسبة لدراسة Godeh et al (2009) و ما يقرب من مرتين من عدد الأنواع في عين الغزالة و لهذا لا يجب اعتبار فقر المنطقة للعناصر الزهرية البحرية استثنائيا (Vitiello et al., 1985).

لا يجب اعتبار الأنواع المتعرف عليها في هذا البحث بأي حال من الأحوال جردا للنباتات البحرية في المنطقة و ذلك لعدة اعتبارات و هي

1 - العدد المحدود جدا للخرجات البحرية و خاصة تلك المتعلقة بجمع الطحالب

2 - انجاز المشاهدات في موسم واحد من السنة

3 - عدم ملائمة هذا الموسم لمشاهدة الطحالب

من المهم ملاحظة أن العديد من الصور الفوتوغرافية تحت المائية المنجزة من قبل المشاركين في المهمة تظهر أنواعا من الطحالب يصعب التعرف عليها في غياب الملاحظات المباشرة للنماذج (على عين المكان و في المخبر بعد جمعها). إن المناظر الصخرية الخالية من النباتات و فقر ما تحت الطبقات لغابات السيستوسيرا و غياب النباتات العادية الخاصة للشاطئ الأوسط هي مظاهر يصعب شرحها في غياب معطيات أخرى حول التطور الموسمي للوضعية. إن آثار الرعي الجائر لغابات السيستوسيرا تبعث على الاعتقاد بأن غياب النباتات المحبة للضوء في الشاطئ التحتي يعود جزئيا للوجود المهم لنوع *Siganus* المعروف بكونه أكلا نهما للنباتات (Levi, 2004) و يمكن أيضا أن يكون افتقار المياه للمغذيات (قلة التغذية) في هذه المنطقة من المتوسط سببا لهذه الملاحظات (Vitiello et al., 1985).

جدول I : قائمة الأنواع المشاهدة, مجموعاتها البيئية و انتماءاتها الحيوية-الجغرافية

Ch : Chlorophycophyta ,He : Heterokontophyta ,Rh : Rhodophycophyta ,Cy : Cyanobacteria
 (Infralittoral, hard bottoms) : ISR / IHdB
 (Photophilous, infralittoral) : PhI / PhI
 (Photophilous, infralittoral, thermophilous) : PhIT / PhIT
 (Photophilous, infralittoral, wave : PhIB / PhIW washed)
 (Photophilous, infralittoral, quiet : PhIC / PhIQ environment)
 (Mediolittoral rocks) : RM / MR
 (Sciaphilous, relatively quiet environment) : S C / SQ
 (sciaphilous, infralittoral) : SI / SI
 (Sciaphilous, infralittoral and circalittoral) : SIC / SIC
 أطلسي : A , أطلسي-قطبي : Ab , أطلسي-قطبي-استوائي : Abt , أطلسي-هادي-استوائي : Apt , أطلسي-استوائي : At ,
 عالمي : C , هندي-أطلسي : IA , هندي-هادي : IP , متوسطي : M , استوائي : P , عالمي جدا : SC.

Phyllum	Classes	Orders	Genus and species	Ecological Group ¹	Affinity biogeographic ²
Cy	Cyanophyceae	Nostocales	<i>Rivularia atra</i>	RM / MR	C
Cy	Cyanophyceae	Nostocales	<i>Rivularia bullata</i>	RM / MR	C
Rh	Florideophyceae	Bonnemaisoniales	<i>Asparagopsis taxiformis</i>	ISR / IHdB	IP*
Rh	Florideophyceae	Ceramiales	<i>Laurencia obtusa</i>	PhI / PhI	C
Rh	Florideophyceae	Corallinales	<i>Amphiroa rigida</i>	PhI / PhI	SC
Rh	Florideophyceae	Corallinales	<i>Corallina elongata</i>	ISR / IHdb	A
Rh	Florideophyceae	Corallinales	<i>Jania rubens</i>	PhI / PhI	C
Rh	Florideophyceae	Corallinales	<i>Mesophyllum</i> sp.	SIC / SIC	
He	Phaeophyceae	Dictyotales	<i>Dictyopteris polypodioides</i>	SI / SI	C
He	Phaeophyceae	Dictyotales	<i>Dictyota dichotoma</i>	PhIC / PhIQ	C
He	Phaeophyceae	Dictyotales	<i>Padina</i> sp.	PhIC / PhIQ	P
He	Phaeophyceae	Fucales	<i>Cystoseira compressa</i>	PhIC / PhIQ	M (Ab)*
He	Phaeophyceae	Fucales	<i>Cystoseira barbatula</i>	PhIC / PhIQ	M
He	Phaeophyceae	Fucales	<i>Cystoseira brachycarpa</i>	PhIC / PhIQ	M
He	Phaeophyceae	Fucales	<i>Cystoseira spinosa</i> var. <i>tenuior</i>	PhIB / PhIW	M
He	Phaeophyceae	Fucales	<i>Cystoseira</i> sp.	PhIC / PhIQ	
He	Phaeophyceae	Sphacelariales	<i>Stypocaulon scoparium</i>	PhIC / PhIQ	SC
Ch	Bryopsidophyceae	Bryopsidales	<i>Flabellia petiolata</i>	AS / AS	At
Ch	Chlorophyceae	Tetrasporales	<i>Palmophyllum crassum</i>	SIC / SIC	APt
Ch	Ulvophyceae	Cladophorales	<i>Anadyomene stellata</i>	PhIT / PhIT	P
Ch	Ulvophyceae	Dasycladales	<i>Dasycladus vermicularis</i>	PhIT / PhIT	At

¹بالنسبة ل (Boudouresque (1984) , ²بالنسبة ل (Cormaci et al. (1982) , *حسب الشكل rosetta أو الشكل compressa. لا يفرق (Gómez Garetta et al. (2000) بينهما.

يوجد بالنسبة لمجموع الأنواع الموجودة وصف ملخص يسمح بالتعرف عليها على الميدان و لمحة بسيطة على بيئتها مأخوذ من دراسات مختصة في شمال غرب المتوسط (ملحق G). يعتبر استعمال أدوات مكبرة لازماً للتعرف على بعض الأنواع.

3.4. اللافقاريات

وقع التعرف على ما يزيد عن ثلاثين نوعاً من اللافقاريات خلال هذه المهمة على طول شاطئ منتزه الكوف الوطني (جدول II) و هي أنواع يسهل مشاهدتها و التعرف عليها في الموقع. لم يقع إجراء أي اقتطاع و لكن وقع أخذ صور من أجل تسهيل التعرف.

جدول III : قائمة أهم اللاقاريات المشاهدة في منطقة منتزه الكوف الوطني و المناطق المجاورة. (*) الأنواع الموجودة على شكل قواقع على الشاطئ.

Scientific name	Branch	Classes	Orders	Family
<i>Chondrosia reniformis</i> Nardo, 1847	Porifera	Demospongiae	Chondrosida	Chondrillidae
<i>Cacospongia scalaris</i> Schmidt, 1862		Demospongiae	Dictyoceratida	Thorectidae
<i>Cliona cellata</i> Grant, 1826		Demospongiae	Hadromerida	Clionaidae
<i>Crambe crambe</i> (Schmidt, 1862)		Demospongiae	Myxillina	Crambeidae
<i>Pelagia noctiluca</i> (Forsskål, 1775)	Cnidaria	Scyphozoa	Semaeostomeae	Pelagiidae
<i>Anemonia viridis</i> (Forsskål, 1775)		Anthozoa	Actiniaria	Actiniidae
<i>Actinia equina</i> (Linnaeus, 1758)		Anthozoa	Actiniaria	Actiniidae
<i>Leptopsammia pruvoti</i> Lacaze-Duthiers, 1897		Anthozoa	Scleractinia	Dendrophylliidae
<i>Cotylorhiza tuberculata</i> (Macri, 1778)	Mollusca	Scyphozoa	Rhizostomeae	Cepheidae
<i>Conus mediterraneus</i> Hwass in Bruguière, 1792		Gastropoda	Neogastropoda	Conidae
<i>Erosaria spurca</i> (Linnaeus, 1758) (*)		Gastropoda	Littorinimorpha	Cypraeidae
<i>Luria lurida</i> (Linnaeus, 1758) (*)		Gastropoda	Littorinimorpha	Cypraeidae
<i>Fasciolaria lignaria</i> (Linnaeus, 1758)		Gastropoda	Neogastropoda	Fascioliariidae
<i>Osilinus turbinatus</i> (Born, 1778)		Gastropoda		Trochidae
<i>Patella caerulea</i> Linnaeus, 1758		Gastropoda		Patellidae
<i>Patella rustica</i> Linnaeus, 1758		Gastropoda		Patellidae
<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i> (Linnaeus, 1758)		Gastropoda	Neogastropoda	Muricidae
<i>Flabellina affinis</i> (Gmelin, 1791)		Gastropoda	Nudibranchia	Flabellinidae
<i>Pinna nobilis</i> Linnaeus, 1758		Bivalvia	Pterioidea	Pinnidae
<i>Octopus vulgaris</i> Cuvier, 1797		Cephalopoda	Octopoda	Octopodidae
<i>Octopus macropus</i> Risso, 1826	Bryozoa	Cephalopoda	Octopoda	Octopodidae
<i>Myriapora truncata</i> (Pallas, 1766)		Gymnolaemata	Cheilostomatida	Myriaporidae
<i>Hermodice carunculata</i> (Pallas, 1766)	Annelida	Polychaeta	Amphinomida	Amphinomidae
<i>Protula</i> sp.		Polychaeta	Sabellida	Serpulidae
<i>Eriphia verrucosa</i> (Forsskål, 1775)	Arthropoda	Malacostraca	Decapoda	Eriphiidae
<i>Ligia italica</i> Fabricius, 1798		Malacostraca	Isopoda	Ligiidae
<i>Euraphia depressa</i> (Poli, 1795)		Maxillopoda	Sessilia	Chthamalidae
<i>Gnathophyllum elegans</i> (Risso, 1816)		Malacostraca	Decapoda	Gnathophyllidae
<i>Percnon gibbesi</i> (H. Milne-Edwards, 1853)		Malacostraca	Decapoda	Plagusidae
<i>Inachus</i> sp.		Malacostraca	Decapoda	Inachidae
<i>Ocypode cursor</i> (Linnaeus, 1758)		Malacostraca	Decapoda	Ocypodidae
<i>Bonellia viridis</i> Rolando, 1821	Echiura	Echiuroidea	Bonelliida	Bonelliidae
<i>Arbacia lixula</i> (Linnaeus, 1758)		Echinoidea	Arbacioida	Arbaciidae
<i>Coscinasterias tenuispina</i> (Lamarck, 1816)	Echinodermata	Asteroidea	Forcipulatida	Asteriidae
<i>Echinaster sepositus</i> Michelin, 1845		Asteroidea	Spinulosida	Echinasteridae
<i>Holothuria (Panniothuria) forskali</i> Delle Chiaje, 1823		Holothuroidea	Aspidochirotida	Holothuriidae
<i>Holothuria (Platyperona) sanctori</i> Delle Chiaje, 1823		Holothuroidea	Aspidochirotida	Holothuriidae
<i>Ophioderma longicauda</i> (Bruzellius, 1805)		Ophiuroidea	Ophiurida	Ophiodermatidae
<i>Paracentrotus lividus</i> (Lamarck, 1816)		Echinoidea	Camarodonta	Parechinidae

وقع تحيين أسماء الأنواع و كذلك تصنيفاتها حسب قاعدة المعلومات « World Regsiter of Marine Species » (<http://www.marinespecies.org/index.php>).

من بين كل هذه الأنواع يعتبر السلطعون *Percnon gibbesi* غازيا ووقع تسجيله لأول مرة في ليبيا قرب ناحية الهنية (32.836750°N 21.513383°E) في منطقة الجبل الأخضر في 2004 في مياه قليلة العمق (Elkrwe et al., 2008). يعتبر هذا السلطعون الشاطئي عشري الأرجل الأكثر غزوا في البحر المتوسط و قد سجل لأول مرة في 1999 في جزر الباليار و صقلية و امتد توزيعه من اسبانيا إلى تركيا.




Percnon gibbesi (H. Milne-Edwards, 1853)

بخصوص الأنواع التي من المهم المحافظة عليها في البحر المتوسط (بروتوكول ASP/DB لاتفاقية برشلونة) وقع إحصاء خمسة أنواع في الجهة البحرية من منطقة الدراسة (الملحق A) ويتعلق الأمر برخويات *Pinna nobilis* و *Erosaria spurca* و *Luria lurida* و الحيوان القشري من عشرين الأرجل *Ocypode cursor* و شوكي الجلد *Paracentrotus lividus*.

وجد الرخوي ذو المصراعين *Pinna nobilis* في الجزء الواقع غرب منطقة منتزه الكوف الوطني على مستوى معشبة البوسيدونيا اوسيانكا و قد شوهد فرد واحد يافع (شكل 25).

شوهدت الرخويات بطنية القدم *Erosaria spurca* و *Luria lurida* في الجزء الشرقي لمنتزه الكوف الوطني على شكل قواقع ميتة على مستوى السواحل الرملية و لم يشاهد أي حيوان حي في الموقع.


يعتبر عشري الأرجل *Ocypode cursor* نوعا خاصا بالشواطئ الجنوبية و الشرقية للمتوسط و كذلك في مستوى الشواطئ الشمالية لشرقي المتوسط (Fischer et al., 1981) وهو نوع ليلي خاص بمصبات الأنهار و الشواطئ الرملية لهذا القطاع. وقع صيده على مستوى العديد من شواطئ منتزه الكوف الوطني و المناطق المجاورة (شكل 26 و 27). يجب التأكيد على أنه وقع التعرف على السلطعون كمفترس كبير لبيض السلحفاة *Caretta caretta* (Barton & Roth, 2008).



شكل 25 : فرد يافع من *Pinna nobilis* على طبقة سيقان ترابية.

شكل 26 : عشري الأرجل *Ocypode cursor* و جحره.

شاهد شوحي الجلد *Paracentrotus lividus* المسجل في الملحق III من بروتوكول ASP/DB (ملحق A) في المنطقة البحرية لمنتزه الكوف ولكن كثافته تبقى قليلة الأهمية بالنسبة للكثافات المعهودة لهذا النوع خاصة بوجود غابات كثيفة للسيستوسيرا و قد أجريت مشاهدات مماثلة على طول الشاطئ الغربي لمصر (Vitiello et al., 1985).



شكل 27 : شواطئ رملية حيث شوهد عشري الأرجل *Ocypode cursor* في منتزه الكوف و المناطق المجاورة (Ibrahim Benamer, غير منشور)


4.4. التجمعات السمكية

أحصي في الجملة 41 نوعا من الأسماك في المنطقة البحرية لمنتزه الكوف الوطني و الجهات المجاورة (الملحق G) و تنقسم إلى 26 عائلة أغلبها من الصبارصيات *sparidés* (7 أنواع), *labridés* (4 أنواع), *serranidés* (4 أنواع) (شكل 28). إن نتائج ملاحظتنا في الموقع تبين ثراء متوسطا للأنواع بالنسبة لقطاعات أخرى في ليبيا و مناطق أخرى من المتوسط (Shakman and Kinzelbach, 2007a). يمكن أن يمثل هذا خصوصية لهذا الجزء من الشاطئ الليبي أو تأثيرا مرتبطا بقصر

مدة الاستكشاف و/ أو فترة الدراسة (أكتوبر). إن إجراء أبحاث في الفترة الصيفية سيساعد حتما على تقييم أفضل لتنوع المجموعات السمكية في المنطقة.

شكل 27 : نوع الأسماك في المنطقة البحرية لمنتزه الكوف الوطني و الجهات المجاورة

Scientific name	branch	Class	Order	Family
<i>Apogon (Apogon) imberbis</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Apogonidae
<i>Atherina</i> sp.	Chordata	Actinopterygii	Atheriniformes	Atherinidae
<i>Balistes capriscus</i> Gmelin, 1789	Chordata	Actinopterygii	Tetraodontiformes	Balistidae
<i>Belone belone</i> (Linnaeus, 1761)	Chordata	Actinopterygii	Beloniformes	Belonidae
<i>Bothus podas</i> (Delaroche, 1809)	Chordata	Actinopterygii	Pleuronectiformes	Bothidae
<i>Chromis chromis</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Pomacentridae
<i>Coris julis</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Labridae
<i>Dasyatis pastinaca</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Elasmobranchii	Rajiformes	Dasyatidae
<i>Dentex (Dentex) dentex</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Sparidae
<i>Diplodus annularis</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Sparidae
<i>Diplodus vulgaris</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Sparidae
<i>Echeneis naucrates</i> Linnaeus, 1758	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Echeneidae
<i>Epinephelus costae</i> (Steindachner, 1878)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Serranidae
<i>Epinephelus marginatus</i> (Lowe, 1834)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Serranidae
<i>Fistularia commersonii</i> Rüppell, 1838	Chordata	Actinopterygii	Syngnathiformes	Fistulariidae
Gobiidae indéterminé	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Gobiidae
<i>Labrus merula</i> Linnaeus, 1758	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Labridae
<i>Lagocephalus scleratus</i> (Gmelin, 1789)	Chordata	Actinopterygii	Tetraodontiformes	Tetraodontidae
<i>Lipophrys nigriceps</i> (Vinciguerra, 1883)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Blenniidae
<i>Lithognathus mormyrus</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Sparidae
Mugilidae indéterminé	Chordata	Actinopterygii	Mugiliformes	Mugilidae
<i>Mullus surmuletus</i> Linnaeus, 1758	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Mullidae
<i>Muraena helena</i> Linnaeus, 1758	Chordata	Actinopterygii	Anguilliformes	Muraenidae
<i>Mycteroperca rubra</i> (Bloch, 1793)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Serranidae
<i>Oblada melanura</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Sparidae
<i>Parablennius zvonimiri</i> (Kolombatovic, 1892)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Blenniidae
<i>Pempheris vanicolensis</i> Cuvier, 1831	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Pempheridae
<i>Rhinobatos</i> sp.	Chordata	Elasmobranchii	Rajiformes	Rhinobatidae
<i>Sarpa salpa</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Sparidae
<i>Scorpaena maderensis</i> Valenciennes, 1833	Chordata	Actinopterygii	Scorpaeniformes	Scorpaenidae
<i>Scorpaena porcus</i> Linnaeus, 1758	Chordata	Actinopterygii	Scorpaeniformes	Scorpaenidae
<i>Seriola dumerili</i> (Risso, 1810)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Carangidae
<i>Serranus scriba</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Serranidae
<i>Siganus luridus</i> (Rüppell, 1829)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Siganidae
<i>Siganus rivulatus</i> Forsskål, 1775	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Siganidae
<i>Sparisoma (Euscarus) cretense</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Scaridae
<i>Spicara maena</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Centracanthidae
<i>Spondyliosoma cantharus</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Sparidae
<i>Symphodus (Crenilabrus) ocellatus</i> Forsskål, 1775	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Labridae
<i>Thalassoma pavo</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Actinopterygii	Perciformes	Labridae
<i>Torpedo (Torpedo) torpedo</i> (Linnaeus, 1758)	Chordata	Elasmobranchii	Torpediniformes	Torpedinidae



شكل 28 : جرد لعائلات الأسماك المشاهدة في منطقة الدراسة

إن البنية التصنيفية النوعية تبدو مطابقة لما هو مشاهد في جهات أخرى من المتوسط في القيعان الشاطئية التي تشمل الصخور و المعاشب والرمال (Guidetti, 2000 ; Harmelin *et al.*, 1995) و لكنها تختلف عنها بأهمية الأنواع الليسيبيسية المعروفة في ليبيا (Shakman and Kinzelbach, 2007a) و قد شوهدت أربع منها في المنطقة المستكشفة وهي *Fistularia commersonii* (Fistulariidae) و *Pempheris vanicolensis* (Pempheridae) و *Siganus luridus* و *S. rivulatus* (Siganidae).



شكل 30 : *Pempheris vanicolensis*



شكل 29 : *Fistularia commersonii*



شكل 32 : *Siganus rivulatus*



شكل 31 : *Siganus luridus*

إن الأنواع *Fistularia commersonii* نادرة نسبياً على الشاطئ الليبي في حين أن الأنواع *Siganus luridus* و *S. rivulatus* عادية على كل الشاطئ (Shakman and Kinzelbach, 2007b) (جدول III). أصبح هذان العاشبان من نوع *siganidae* أكثر وفرة من الأنواع العاشبة الأصلية الشلبة *Sarpa salpa* (Sparidae) و *Sparisoma cretense* (Scaridae) و يعثر على *S. rivulatus* عادة في الجزء الشرقي من الشاطئ الليبي في حين يوجد *S. luridus* أكثر في الجزء الوسطي و الغربي (Shakman and Kinzelbach, 2007b).

إن وجود العديد من الأشكال السمكية اليافعة على طول الشاطئ المستكشف تعتبر سمة واضحة للجهة البحرية لمنتزه الكوف الوطني و خاصة لأنواع هشة مثل المارو البني (*Epinephelus marginatus*) و المارو الرمادي (*Epinephelus costae*) و المارو الملكي (*Mycteroperca rubra*). زيادة على ذلك فإن المارو البني مرسوم على الملحق III من بروتوكول ASP/DB (الملحق A) و على الملحق III لمعاهدة بارن.

الجدول III : وفرة و موطن الأنواع الأربعة اللبسيبية المشاهدة في الجزء البحري لمنتزه الكوف الوطني على الشاطئ الليبي (المصدر: Shakman and Kinzelbach, 2007a). (×) أنواع غائبة.

Species	Habitat	West Region	Sirt Region	East Region
<i>S. luridus</i>	vegetated	Commune	Commune	Commune
<i>S. rivulatus</i>	vegetated	Commune	Commune	Commune
<i>F. commersonii</i>	Sandy	Rare	Rare	Rare
<i>P. vanicolensis</i>	Rocky	×	×	Rare

5.4 الاستعمالات و الضغوطات البشرية

خلال هذه المهمة الميدانية تم التعرف بصفة خاصة على أربعة مؤثرات على الوسط الشاطئي. يبدو انتزاع الرمل من الشاطئ لغرض البناء (شكل 33) أهم ضغط مسلط على الوسط و هو يضعف الشاطئ و يساعد على الانجراف الساحلي و ينتج عنه تكوين أحواض صغيرة خلف الشاطئ تقع تحت مستوى البحر (شكل 34).



شكل 34 : حوض صغير مرتبط بانتزاع الرمل



شكل 33 : انتزاع الرمل على طول الشاطئ

يتمثل ثاني المشاكل الموجودة في استعمال المتفجرات من قبل الصيادين. إضافة إلى نسبة الموت الكبيرة الناتجة عن هذا النوع من الصيد فإنه يؤدي كذلك إلى إتلاف كبير للموارد ذلك أن نسبة كبيرة منها لا يقع استهلاكها (أسماك يافعة, أسماك ضائعة, أنواع غير ذات قيمة.....) و هي زيادة على ذلك تدمر المواطن بصفة دائمة و ترهن قدرة الوسط على التجدد (شكل 35).

إن المصدرين الباقين لتدهور الوسط ليسا خاصين بشاطئ منتزه الكوف الوطني ولكنهما مع الأسف ظاهرتان جهويتان (على مستوى حوض المتوسط) و يتمثل ذلك أساسا في إلقاء المحروقات الناتجة عن استخراج و تحويل و نقل هذه المواد (شكل 36) و النفايات الكبيرة و خاصة الأغلفة البلاستيكية وفي هذه الحالة أيضا فإنه يمكن أن تكون لهذه التأثيرات البشرية نتائج ثقيلة مثل إمكانية استهلاك السلاحف البحرية للأكياس البلاستيكية عوضا عن فرائسها المعتادة : المدائن (in UNEP-MAP- RAC/SPA, 2004).



شكل 36: نفط على طول الساحل



شكل 35: السمك الميت بعد الصيد بالديناميت

6.4 التكوين

بالتوازي مع الجولات الميدانية خصص جزء مهم من هذه المهمة لتبادل التجارب و تكوين الخبراء الليبيين في الاكولوجيا البحرية (بين 10 و 15 مشاركا, الملحق H). أنجز هذا العمل بثلاث طرق متكاملة :

- تكوين ميداني يسمح بالتعرف على أهم الأنواع التي وجدت.
- تكوين نظري حول أهم التجمعات و الأنواع التي وقع العثور عليها.
- ورشات موضوعية لتحديد و أو تحليل النماذج المقتطعة.

وقع التكوين الميداني أثناء الزيارات على طول الشاطئ (شكل 37) و خلال الغطس و تمثل خاصة في نقاشات تسمح بتأليف الملاحظات و تحديد الأنواع المتحصل عليها في الموقع خلال الورشات (شكل 38).



شكل 38 : ورشة حول البوسيدونيا اوسيانیکا



شكل 37 : ملاحظة أنواع من الشاطئ الوسطي

دارت هذه الورشات حول

- تحديد أنواع سيستوسيرا التي وقع جنيها

- التحليل المظهري و التحليل الزمني لدورة الأوراق لحزم البوسيدونيا اوسيانكا.
- تحديد أنواع اللاقاريات و الأسماك المتحصل عليها أو المشاهدة (شكل 39, 40, 41).



شكل 41 : عرض حول تصنيف السيسنوسيرا.



شكل 40 : التعرف على اللاقاريات التي وقع الحصول عليها في الموقع



شكل 39 : التعرف على الأسماك المقدمة من الصيادين.

و أخيرا أنجزت العديد من العروض النظرية (ملحق I) تتبعها عادة أسئلة و نقاشات مع مختلف المشاركين و تمثلت أساسا في عروض حول :

- التنوع الإحيائي المتوسطي.
- أهم الفئات الإحيائية التي وقع العثور عليها (طحالب محبة للضوء, معاشب بوسيدونيا و تجمعات مرجانية).
- وزعت نسخ إعلامية لهذه العروض على جميع المشاركين.

(5) خلاصة و توصيات

يظهر شاطئ منتزه الكوف الوطني حالة محافظة مقبولة بالرغم من بعض التأثيرات البشرية التي وقع التعرف عليها و لكن و من أجل إدماج أهم الفئات الإحيائية الموجودة و خاصة معاشب البوسيدونيا اوسيانكا فإنه يبدو ومن الحكمة توسيع منطقة الصيانة إلى ما بعد الحدود الحالية للمنتزه. إضافة إلى ذلك فإن وجود مواطن مناسبة للفقمة الراهبة (*Monachus monachus*) أكثر نحو الغرب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار في مخطط التصرف لهذا الساحل (ISPRA, 2009).

على مستوى الأنواع المتعرف عليها و حتى و إن لم يظهر الموقع تنوعا إحيائيا استثنائيا بفعل موقعه الجغرافي (الحوض الشرقي المتميز بمياه قليلة الغذاء) و قصر المدة و موسم الاستكشاف فقد شوهد 20 نوعا من النباتات الكبيرة (من بينها نبتة ملنخوليا بحرية) و 33 نوعا من اللاقاريات و 41 نوعا من الأسماك. تؤكد الأبحاث المجراة سابقا في هذا القطاع من البحر الأبيض المتوسط الفقر العام للتجمعات القاعية (Vitiello et al., 1985 و WWF/EGA/NBRC, 2004).

على مستوى التصرف فإن التدخلات الموجودة و خاصة المحافظة على بيوض السلحفاة *Caretta caretta* (شكل 43) و المهمات الميدانية التي تسمح بالتعرف على المواطن و الأنواع الموجودة يجب أن تكون مستدامة. من ناحية أخرى فإنه يجب الانتباه بصفة خاصة لمعشب البوسيدونيا اوسيانكا و خاصة عمق حدوده السفلى الذي و باعتبار شفافية المياه يمكن أن يصل إلى مستويات لم تشاهد من قبل في الوسط.

إن تنظيم مهمة جديدة في بداية الصيف يمكن أن يسمح باستكمال هذا الجرد الأول و الحصول على معلومات جديدة حول أهمية هذا الشاطئ بالنسبة للصيانة. إن مجموع المعلومات التي وقع جمعها خلال هذه المهمة قد وقع إدراجها في الاستمارة النموذجية للمعطيات المعدة من قبل مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (CAR/ASP) لتقييم أهمية هذا الموقع للمحافظة (ملحق J) و هي الاستمارة الثالثة التي وقع ملؤها بالنسبة لليبيا بعد البحيرة الشاطئية الفروه و شاطئ عين الغزالة (Pergent et al., 2006 و Pergent & Pergent-Martini, 2000).

يجب أن يحظى انتزاع الرمل من الشواطئ بأولوية من حيث التصرف في هذا الساحل وإنه من الحكمة وضع خطة بحث تمكن من اقتراح خيارات صالحة لأمد طويل (مواقع ذات أهمية, كميات, إمدادات تقنية أو مالية) و يبدو مهما من ناحية أخرى تقييم الانتزاعات المرتبطة بالصيد المحترف و خاصة الأضرار التي لها علاقة ببعض الممارسات (الصيد بالديناميت).



شكل 43 : أسوار لصون بيوض السلحفاة *Caretta caretta* شكل 44 : مهمة استكشاف شاطئ منتزه الكوف الوطني.

و أخيرا و تبعا لهذه المهمة فإن التكوين الموضوعي للخبراء الليبيين مطلوب على الأغلب (التصنيف, التعرف على المواطن القاعية التي لها علاقة بالاستمارة النموذجية للمعطيات, تصوير الخرائط, التأثيرات البشرية, التصرف في المساحات البحرية المحمية) و يمكن أيضا استقبال خبراء لمدة قصيرة (1 إلى 3 أشهر) في فرق بحث أو مؤسسات تعنى بالتصرف في المساحات البحرية المحمية لاستكمال تكوينهم.

- Allender B., Kraft G. (1983) - The marine algae of Lord Howe Island (New South Wales): Dictyotales and Cutleriales (Phaeophyta). *Brunonia* 6: 73-130.
- Baker N.E., 1980. Diurnal raptors of the Jabel Akhdar-Libya. Unpub. Report: 1-25.
- Baker N.E., 1984. Counts of Greater Flamingos in Eastern Libya. ICBP-IWRB Flamingo Working Group Newsletter No. 2: 19-21.
- Barton B.T., Roth J.D., 2008 Implications of intraguild predation for sea turtle nest protection. *Biological conservation*, 141: 2139-2145.
- Boudouresque C.F., 1984. Groupes écologiques d'algues marines et phytocenoses benthiques en Méditerranée Nord-Occidentale : une revue. *Giornale Botanico Italiano*, 118(2) : 7-42.
- Boulos L., 1975. The Mediterranean element in the flora of Egypt and Libya. In La flore du bassin méditerranéen : Essai de systématique synthétique No. 235 CRNS :119-124.
- Cormaci M., Duro A., Furnari G., 1982. Considerazioni sugli elementi fitogeografici della flora algale della Sicilia. *Naturalista Siciliano*, ser. IV, 6(Suppl.) (1): 7-14.
- Delepine R., Boudouresque C.F., Frada Orestano C., Noailles M.-C., Asensi A., 1987. Algues et autres végétaux marins. In : Fischer, W., M.-L. Bauchot et M. Schneider (rédacteurs), Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins de la pêche. (Révision 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Volume I. Végétaux et Invertébrés. Publication préparée par la FAO, résultat d'un accord entre la FAO et la Commission des Communautés Européennes (Projet GCP/INT/422/EEC) financée conjointement par ces deux organisations. Rome, FAO, Vo1.1: 760 p.
- Fischer, W., G. Bianchi and W.B. Scott (eds.) 1981 True Crabs. 6: pag.var. In: FAO species identification sheets for fishery purposes. Eastern Central Atlantic (fishing areas 34, 47; in part). Canada Funds-in-Trust. Ottawa, Department of Fisheries and Oceans Canada, by arrangement with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1-7: pag.var.
- Godeh M. M., El-Menifi F. O., Said A.A., 2009. Marine algae of Tobruk and Ain Ghazala coasts, Libya. *Journal of Science and Its Applications*. Garyounis University Press, 3(1): 42-55.
- Gómez Garreta A., Barceló Martí M.C., Gallardo García T., Pérez-Ruzafa I.M., Ribera Siguán M.A., Rull Lluch J., 2000. *Flora Phycologica Iberica, Vol.1., Fucales*. Universidad de Murcia, Murcia : 1-192.
- Guidetti P., 2000. Differences among fish assemblages associated with nearshore *Posidonia oceanica* seagrass beds, rocky-algal reefs and unvegetated sand habitats in the Adriatic Sea. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 50: 515-529.
- Hamel G., 1931-1939. Phéophycées de France. Impr. Wolf, Rouen, i-xlvi + 1-432 + 10 pl. h. t.
- Harmelin J.G., Bachet F., Garcia F., 1995. Mediterranean marine reserves: fish indices as tests of protection efficiency. *P.S.Z.I: Marine Ecology*, 16 (3): 233-250.
- Hemsley J.H., 1981. Establishment of the Wadi Al Kouf National Park. UNESCO. Report RP/1979-80/2/7.6/06.

- ISPRA 2009. Preliminary technical report on marine cave survey and camera trap deployment in Libya coastal stretch Derna-Ras Tin; July 29-August 16, 2009. by Leonardo Tunesi and Giulia Mo. 6 p.
- Elkrwe H.M., Ihawaj H.M., Galil B.S., ben Abdallah A., 2008. The first record of *Percnon gibbesi* (H. Milne Edwards, 1853) (Crustacea: Decapoda: Plagusiidae) from the southern rim of the Mediterranean. *Aquatic Invasions*, 3 (2): 243-245.
- Hufnagl I., 1972. Libyan mammals..Stoughton & Harrow, Tripoli, The Oleander Press 1-85.
- Pergent G., Djellouli A., Hamza A., Ettayeb K., Alkekli A., Talha M., Alkunti E., 2006. Etude des communautés végétales benthiques dans les lagunes côtières d'Ain Al-Ghazala et de Farwa (Libye). Centre d'Activité Régionale pour les Aires Spécialement Protégées : 64p + annexes.
- Pergent G., Pergent-Martini C., 2000. Field Study in Libya - Study of the vegetation in the lagoon of Farwà. Regional Activities Centre for Specially Protected Areas and University of Corsica / contract N°38/99: 1-48 + Annexes.
- Pergent-Martini C., Pergent G., 2010. Propositions de lignes directrices pour la standardisation des méthodes de cartographie et de surveillance des magnoliophytes marines en Méditerranée. PNUE-PAM-CAR/ASP, Contrat N°72/2009, Tunis :1 - 66.
- Pergent-Martini C., Rico-Raimondino V., Pergent G., 1994. Primary production of *Posidonia oceanica* in the Mediterranean basin. *Marine Biology*, 120: 9-15.
- UNEP-MAP-RAC/SPA, 2004. Guidelines to improve the involvement of marine rescue centres for marine turtles. RAC/SPA édit, Tunis: 1-38 + annexes.
- PNUE-PAM-CAR/ASP, 2009. Rapport sur le projet MedPosidonia. Rais C., Pergent G., Dupuy de la Grandrive R., Djellouli A. eds. Document d'information pour la neuvième réunion des points focaux nationaux pour les ASP, Floriana – Malte, 3 – 6 juin 2009, CAR/ASP Publ., UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.11: 1-107 + ann.
- Shakman E. A., Kinzelbach R., 2007a. Distribution and characterization of Lessepsian migrant fish along the coast of Libya. *Acta. Ichthyologica et Piscatoria* 37 (1): 7-15.
- Shakman E. A., Kinzelbach R., 2007b. Commercial fishery and fish species composition in coastal waters of Libya. *Rostocker Meereskundliche Beiträge* 18: 65-80.
- Vitiello P., Boudouresque C.F., Carres J.C., Hassan E.M.A., Maubert H., Sourenian B., Thelin I., 1985 - Le benthos littoral d'El Dabaa (Méditerranée, Egypte). 1. Données générales sur le domaine benthique, *Rapp. Commiss. internation. Mer Médit.*, 29 (5): 245-246.
- WWF/EGA/NBRC, 2004. The Marine and coastal resources assessment of the Eastern Region of Libya Background study for the preparation of a Conservation Plan. Environmental General Authority of Libya, National Biology Research Centre of Libya and WWF Mediterranean Programme Office, Rome-Italy: 1-63.